

Инструкция по применению: информация для потребителя

OSTEOGĚLS 10% гель *Dimethylis sulfoxidum*

Перед применением этого лекарственного средства внимательно прочитайте всю инструкцию, так как она содержит важную для Вас информацию.

Всегда применяйте это лекарственное средство именно так, как указано в этой инструкции, или в соответствии с указаниями врача или фармацевта.

- Сохраните эту инструкцию! Возможно, позже ее потребуется перечитать.
- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, обратитесь к фармацевту.
- Если у Вас появились какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Это относится также к побочным действиям, не упомянутым в этой инструкции. Смотрите пункт 4.
- Если Вы заметили какие-либо побочные действия, не упомянутые в этой инструкции, или какое-либо из упомянутых побочных действий у Вас проявляется тяжело, пожалуйста, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.
- Если состояние Вашего здоровья ухудшилось или не улучшилось, Вам следует обратиться к врачу.

Из этой инструкции можно узнать:

1. Что такое OSTEOGĚLS, и для чего его применяют
2. Что Вам следует знать перед применением OSTEOGĚLS
3. Как применять OSTEOGĚLS
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить OSTEOGĚLS
6. Содержимое упаковки и другая информация

1. Что такое OSTEOGĚLS, и для чего его применяют

При лечении боли в пораженных ревматизмом суставах, сухожилиях и мышцах, при остеохондрозе, местных воспалительных процессах различного происхождения, а также при лечении боли в мышцах и суставах, вызванной ушибами и растяжениями.

2. Что Вам следует знать перед применением OSTEOGĚLS

Не применяйте OSTEOGĚLS в следующих случаях:

- если у Вас аллергия на диметилсульфоксид или какие-либо другие ингредиенты (упомянутые в пункте б) этого лекарственного средства;
- если у Вас нарушена выводящая функция почек;
- если у Вас стенокардия;
- если у Вас заболевание глаз (например, глаукома или катаракта);
- если Вы беременны или кормите ребенка грудью.

Предупреждения и меры предосторожности при применении

Перед применением OSTEOGĚLS проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

- Обязательно следует лечить основное заболевание, вызывающее боль.
- Применять только наружно. Не наносить на раны.
- Перед началом применения OSTEOGĚLS желательно нанести препарат на небольшой участок здоровой кожи. В случае покраснения или других признаках раздражения применение лекарственного средства нежелательно.
- После нанесения лекарственного средства следует вымыть руки.

Другие лекарственные средства и OSTEOGĒLS

Расскажите врачу или фармацевту обо всех лекарственных средствах, которые принимаете, принимали в последнее время или могли бы принимать.

Не рекомендуется наносить на один и тот же участок кожи несколько лекарственных средств одновременно.

Беременность и кормление грудью

Не применяйте OSTEOGĒLS во время беременности и кормления грудью, так как нет соответствующих данных о применении лекарственного средства во время беременности и кормления грудью.

Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов

Влияние на способность управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы маловероятно.

3. Как применять OSTEOGĒLS

Всегда применяйте это лекарственное средство так, как описано в этой инструкции или в соответствии с указаниями врача или фармацевта. В случае неясности обращайтесь к врачу или фармацевту.

Для применения на кожу.

Небольшое количество геля тонким слоем легко втирают в больные места два или, по мере необходимости, несколько раз в день.

Каждый раз после применения геля следует вымыть руки.

Если Вы использовали OSTEOGĒLS больше, чем определено

Случаи передозировки не наблюдались. Теоретически возможны побочные действия, описанные в пункте 4.

Если Вы забыли применить OSTEOGĒLS

Продолжайте применять лекарственное средство, как только об этом вспомните.

Если Вы прекратили применять OSTEOGĒLS

При прекращении применения лекарственного средства боль может возобновиться. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по применению этого лекарственного средства, спрашивайте у врача или фармацевта.

4. Возможные побочные действия

Также как и все лекарственные средства, это лекарственное средство может вызывать побочные действия, хотя они могут проявляться и не у всех.

С момента выхода лекарственного средства на рынок (1996 г.) сообщений о побочных действиях не поступало.

В соответствии с доступными литературными данными, диметилсульфоксид может вызывать следующие нежелательные побочные действия (частота встречаемости побочных действий - не известны (не возможно определить по имеющимся данным)):

Нарушения иммунной системы:

Реакции повышенной чувствительности (покраснение, сыпь, крапивница) и жжение на месте нанесения геля, бронхоспазм.

Повреждения кожи и подкожных тканей:

Раздражение кожи и повреждение эпителия.

Нарушения желудочно-кишечного тракта:

Тошнота, рвота, неприятный чесночный запах изо рта.

Если у Вас возникли какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Это также относится к возможным побочным действиям, не упомянутым в этой инструкции.

Уведомление о побочных действиях

Если у Вас возникли какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Это также относится к побочным действиям, не упомянутым в данной инструкции. Также Вы можете сообщить о побочных действиях непосредственно в Государственное агентство по лекарственным средствам, ул. Ерсикас (Jersikas ielā) 15, Рига, LV-1003.

Тел.: +371 67078400; факс: +371 67078428. Официальный сайт: www.zva.gov.lv.

Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь в сборе более подробной информации о безопасности данного лекарственного средства.

5. Как хранить OSTEOGĒLS

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в невидимом и недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности, указанного на коробочке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

Не выбрасывайте лекарственное средство в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спрашивайте у фармацевта, как выбрасывать лекарственное средство, которое больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и другая информация

Что содержит OSTEOGĒLS

- Активное вещество - диметилсульфоксид. 1 г геля содержит 100 мг диметилсульфоксида.
- Вспомогательные вещества: мятное масло, пихтовое масло, магния сульфат, карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль, желатин, глицерин, спирт этиловый, вода очищенная.

Внешний вид и упаковка OSTEOGĒLS

Баночка из полиэтилена высокой плотности с крышкой из полиэтилена высокой плотности с приклеенной этикеткой и инструкцией по применению. В упаковке 50 г геля.

Опечатанный алюминиевый тюбик с навинчивающейся пластмассовой крышкой в картонной коробочке. В упаковке 40 г геля.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

ООО «SILVANOLS»

ул. Курбада 2А

LV-1009, Рига, Латвия

тел.: +371 67142829

факс: +371 67142833

е-почта: info@silvanols.lv

Эта инструкция по применению последний раз была пересмотрена 04/2016.

Перевод с латышского.